

活

人

書

活人書卷第十二

此一卷說藥證并藥方加減法所謂藥證者藥方前有證也如某方治某病是也傷寒有證異而病同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審知其證者某經之病某湯者某證之藥然後用之萬全矣又况百問中一證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡湯生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是

宋本作付

劉宋葛發

萬中失

劉宋白木
治燥

治下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以
對治之則無不中矣所謂藥方并加減法者仲景
傷寒方一百一十三道病與方相應乃用正方稍
有差別即隨證加減昔人云學方三年無病可醫
療病三年無方可治往往世傳為名論竟不知執
方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥
如斗運轉故攻病的而取効速一服知二服愈假
如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便
不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓

利水故腎氣動者去白朮小便不利者加茯苓以
此推之然後知不可執方療病湏是隨證加減今
於逐方下說病證用藥加減庶幾脗合之際便見
治法兼古方凡稱改阻者直云剗如麻豆大云一
升者只用一大白蓋以古准今易曉而通用也尋
常疾勢輕者只抄籠末五錢七水一盞半入葛葉
煮七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古
劑法古之三兩即今之一兩也二兩即今之六錢
半也古之三升即今之一升也料例大者只
合三分之
一足矣

桂枝湯曰太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴
乾嘔者宜服之○太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜
服之○太陽病下之後其氣上衝者宜服之○桂枝
本爲解飢若脈浮緊發熱汗不出者不可與之○太
陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯
○服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯若形似瘧
一日再發者宜桂枝二麻黃一湯○服桂枝湯大汗
出大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之○服
桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之○
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂
枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之
厥愈更作芍藥甘草湯與之其脚伸若胃氣不和與
調胃承氣湯若重發汗加燒針者四逆湯主之○太
陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜服○太陽病
外證未解不可下也下之爲逆解外宜服○太陽病
先發汗不解復下之脉浮者不愈浮爲在外而反下
之故今不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜服

別作時作
熱

浮數上當
有脈字

○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧也以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜服○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者衛氣不和也先其時發汗則愈宜服○傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小便利清者知不在裏當發汗宜服○傷寒發汗解半日許復熱煩浮數者可更發汗宜服○傷寒豎下之清穀不止身疼痛急當收裏後身疼痛清便自調急當收表收裏宜四逆湯收表宜桂枝湯○太陽病發熱

汗出榮弱衛強故使汗出欲收邪風宜服○傷寒大
下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞先解表表解
乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯
○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈
其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹
急結者乃可攻之宜桃核承氣湯其解外宜服已上屬太陽
○陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜服○病
人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脉實者宜大承氣
湯脉浮虛者宜服已上屬陽明○太陰病脉浮可發汗宜

服

屬太陰

○下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫

裏宜四逆湯攻表宜服

屬厥陰

○吐利止身痛不休宜

桂枝湯小和之

屬霍亂

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生薑

五片棗子二枚煮至一盞去滓溫服須臾飲熱稀

粥一盞以助藥力溫覆令一時許遍身熱熱微似

有汗者佳○

加減法

桂枝湯自西北二方居人四時

行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之自春末

仲景遺三
附錄十二
叔水七升
既三升服
一升

及夏至已前桂枝證可加黃芩一分謂之陽旦湯
夏至後有桂枝證可加知母半兩石膏一兩或加
升麻一分若病人素虛寒者正用古方不在加減
也○戒曰桂枝最難用雖云表不解脈浮可發汗
宜桂枝湯頂是病人常自汗出小便不數手足溫
和或手足指稍作微冷少頃却溫身雖微似煩而
又增寒始可行之若病人身無汗小便數或手足
冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也
仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與

桂枝麻黃各半湯
太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜服

陽太

桂枝

芍藥

甘草

炙各八錢

麻黃

半兩湯泡焙杼

杏仁

一十二箇湯浸去皮尖兩人不用

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見辯誤

桂枝麻黃各半湯
桂枝半兩芍藥半兩麻黃半兩杏仁四箇生薑二兩棗子四枚水九升元

以汗入合
服六合此

膏藥其當

用五錢

別本服上者

病入二字

仲景方桂枝

二兩十七銖

芍藥二兩杏

人二兩甘草

二兩二銖

麻黃十六銖

水五升先煮

貴肉集聚二

升服升日

再服桂枝

清用八錢三

生方集用

桂枝二麻黃一湯三服桂枝湯大汗出脉洪大者與

桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必晡宜

服屬太

桂枝八錢

芍藥五錢

杏仁八箇湯

甘草二分

麻黃三錢一字湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服以微汗為度見

桂枝二越婢一湯四太陽病發熱惡寒熱多寒少脉

微弱者此無陽也不可發汗宜服之屬太

古八書

六錢半

黃芩四錢

三錢半

用五錢半

仲景桂枝湯

漢書各十

八錢

四錢

八錢

兩三錢

枚水五升

麻黃肉

二升服一升

據此

用三分

仲景水八

升取一升

桂枝

芍藥

甘草

各半

石膏

六錢

麻黃

半兩湯泡去黃汁焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見

桂枝加桂湯五燒針令其汗針處被寒核起而赤者

必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯與

此藥屬太

桂枝

五兩

芍藥

三兩

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

升

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝湯加桂以桂能泄奔豚氣也

桂枝加附子湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風

小便難四支微急難以屈伸者宜服之

屬太陽

桂枝

去皮

芍藥

各一兩半

甘草

一兩炙

附子

炮去皮用半箇

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分太滓溫服

桂枝去芍藥湯

太陽病下之後脈促胃浦者宜服

之屬太陽

桂枝

一兩半去皮

甘草

一兩炙

仲景桂枝三兩甘草

仲景桂枝芍藥三兩甘草二兩附子一枚生薑三兩棗十二枚水八升取三升服一升

二兩生薑
三兩桑十
二枚水七
升取三升
服一升

律藥桂枝
三兩甘草
二兩附子
一枚生薑
三兩桑十
二枚水八
升取三升
服一升

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服芍藥味酸厥促胃滿恐成結胃

故去芍藥佐則早用辛甘發微毒氣也

桂枝去芍藥加附子湯太陽病下之後脈促胃滿

者桂枝去芍藥湯主之若微寒者宜服之屬太陽

桂枝一兩半去皮 甘草一兩炙 附子去皮用半箇炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去桂加茯苓白朮湯凡服桂枝湯或下之仍頭

項強痛翁翁發熱無汗心下滿微疼小便不利者此

主之 屬太陽

芍藥

茯苓

白朮

各一兩半 甘草 炙一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 傷寒脈浮

醫火劫之亡陽必驚狂卧起不安者此主之 屬太陽

桂枝

蜀漆

各一兩半 甘草 炙一兩

牡蠣

二兩

龍骨

二兩

仲景桂枝
蜀漆三兩
甘草二兩
牡蠣五兩

此仲景藥
三兩茯苓
白朮三兩
甘草一兩
水八升取
三升服一
升

龍骨四兩
 生薑三兩
 棗十二枚
 水一斗二
 升煮減
 二升內藥
 取三升服
 一升
 仲景方桂
 枝三兩人
 參三兩芍
 藥四兩甘
 草二兩生
 薑四兩粳
 米二升餘
 飯桂枝湯
 法服

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

十一

發汗後身疼痛

脈沉遲者此主之

屬太陽

桂枝

人參

各一兩半

芍藥

二兩

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥湯

十二

太陽病下之因腹滿痛屬太陰

此主之

仲景方生
薑三兩
十二枚
依桂枝湯
注

仲景方桂
枝三兩
芍藥六兩
甘草二兩
黃一兩
生薑三兩
十二枚
水七升
取三

桂枝

三兩

甘草

二兩

芍藥

六兩下利者先煎芍藥三四沸

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加大黃湯

十二

太陽病反下之因腹滿痛屬太

陰桂枝加芍藥湯主之大實痛者此主之

桂枝

六分

芍藥

三兩

甘草

一兩

大黃

二兩

痛甚者加大黃

大實痛者加一兩半虛者減之

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見

升服一升
日三服此
大黃當用
一兩

仲景方桂
枝一兩甘
草牡蠣龍
骨二兩為
末水五升
取二升半
服八合日
三

仲景方桂
枝二兩甘
草二兩水
三升取一

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十四
火逆下之因燒針煩躁
者此主之屬太陽

桂枝半兩甘草炙牡蠣熬龍骨各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝甘草湯十五發汗過多其人叉手自冒心心下

悸欲得按者此主之屬太陽

桂枝二兩甘草炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

桂枝人參湯

十六

太陽病外證未除而數下之遂協

熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者此主之

桂枝

三錢兩

甘草

一兩三錢

乾薑

炮

人參

白朮

兩各

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分

去滓溫服日再夜一服

桂附湯

十七

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者此主之若其人大

桂枝湯方桂枝
上草四兩乾
薑不煨人參
白朮三兩水
升先取五
升肉桂枝取
三升服二升
日再夜一
原本作桂枝
湯即桂枝附
子湯證也
于六十九日

附子

湯本按改而

去其重固

之

仲景方桂枝

湯附子去鹽

三兩甘草二

兩藥十二枚

水六升取五

合服

雲方不枚

三兩甘草二

兩芍藥三兩

桂枝湯

便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

屬太陽

桂枝

二兩若大便秘小便自利者去桂加白朮三兩

附子

一箇半炮去皮

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服杪五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服日三服

桂枝加葛根湯

十八

太陽病項強几几反汗出惡風

者此主之

伊尹湯液論桂枝湯中加葛根今監本用麻黃誤矣

桂枝

甘草

炙

芍藥

各六錢三字

葛根

一兩三錢

麻黃

一兩一錢本無

二枚水八升
先煮葛根減
二升內諸藥
更升服可

仲景方於
桂枝湯方
內加厚朴
二兩杏仁
五十箇餘
俱前法

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓服覆取微汗

桂枝加厚朴杏子湯十九太陽病下之微喘者表未

解故也此主之屬太陽

桂枝去皮 芍藥各一兩 甘草六錢三

杏仁去皮尖 厚朴去皮薑汁炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚煮至八分去滓溫服覆取微汗

麻黃湯二十太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘

者宜服○太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜服○
太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胃
滿者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與服之○太陽
病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在
此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄
衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脉浮
緊不發汗因衄此主之已上屬太陽○陽明病脉浮無汗
而喘發汗則愈宜服○脉但浮無餘證者與服若不
渴腹滿加噦者不治已上屬陽明

仲景方中
甘草一兩桂
枝二兩杏
仁七十箇
麻黃三兩
水九升先
煮麻黃減
二升內餘
藥取二升
分服八合

甘草

半兩

桂枝

一兩

杏仁

三十五箇
去皮尖

麻黃

一兩半去節百沸湯
洗去黃汁焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服覆取微汗不須飲粥

加減法

傷寒熱病

藥性須涼不時太溫夏至後麻黃湯須加知母半

兩石膏一兩黃芩一分益麻黃湯性熱夏月服之

有發黃斑出之失惟冬及春與病人素虛寒者乃

用正方不在加減

麻黃杏仁甘草石膏湯

三十二

發汗後不可更行桂枝

仲景方其
草二兩石
膏半斤杏
人五十箇
麻黃二兩
水七升先
煮減二升
內麻黃取
二升服一
升

湯汗出而喘無大熱者可與此服之

屬太陽

甘草

一兩炙

石膏

四兩碎綿裹

杏仁

二十五箇去皮尖

麻黃

二兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

麻黃附子甘草湯

廿三

少陰病得之二三日可與此

藥微發汗以二三日無證故微發汗也

屬少陰

麻黃

二兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

甘草

二兩炙

附子

一枚炮去皮破八片

仙景方水
七升先煮
麻黃一兩
沸內藥取
三升服一
升日三

便景方水
一斗先煮
麻黃減二
升內藥取
三升服一
升日三

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服相次三兩服以身微汗為度

麻黃細辛附子湯廿三少陰病始得之反發熱脈沉

者此主之屬少陰

麻黃二兩去節湯泡去黃汁焙乾研細辛二兩

附子一枚炮去皮破八片

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃連翹赤小豆湯廿四傷寒瘀熱在裏身必黃此

神效方麻 黃二兩并 草二兩并 小豆一升 杏仁四十 脂生梓白 皮一升連 翹二兩并 十二枚生 薑二兩水 一斗先煮 麻黃再沸 內藥取三 升分三服 半日服盡 漸下作人

主之 屬陽

麻黃

一兩去節湯泡 去黃汁焙乾秤

甘草

一兩

赤小豆

半升

杏仁

二十枚 去皮尖

生梓白皮

切二兩

連翹

一兩或作半兩連翹根是

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚潦水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃升麻湯

二十五

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止

者為難治此主之

陽厥

麻方三
 作十八
 炮一分作
 六鉢水一
 斗先煮麻
 黃一兩湯
 內藥取三
 升分三服
 相去如炊
 三斗米頃
 令盡

麻黃

二兩半去節湯泡
去黃汁焙乾拌

升麻

當歸

各一兩
一分

知母

黃芩

萎蕤

各三
分

芍藥

麥門冬

去心

桂枝

去皮

茯苓

甘草

炙

乾薑

炮

石膏

碎綿
裹

白朮

各一
分

右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八
 分去滓溫服相次一炊久進一服汗出愈

葛根湯

二十六

太陽病項背強几几無汗惡風又太陽

與陽明合病者必自利此並主之

屬太

仲景方葛

根四兩桂

枝甘草芍

藥二兩麻

黃三兩麻

十二枚水

一斗煮葛

根麻黃減

二升內藥

取三升服

一升

仲景方葛

根四兩半

夏半升甘

草桂枝芍

藥一兩麻

黃三兩半

右剉如麻

豆大每服

葛根 二兩

桂枝 去皮

甘草 炙

芍藥 各一兩

麻黃 一兩半去節湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取汗為度

葛根加半夏湯

二十七

太陽與陽明合病不利但嘔

者此主之 屬太陽

葛根 四兩或作一兩 半夏 六錢一字

麻黃 三分去節湯泡去黃汁焙乾秤

甘草 炙

桂枝 去皮

芍藥 各半

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

三升水

一斗煮

黃連二升

肉桂取三

升服一升

仲景方

根半斤

本二兩

連二兩

早二兩

八升煮

放水一盞半煮至八分去滓溫服覆取微汗

葛根黃芩黃連湯三十八太陽病桂枝證醫反下之利

遂不止脉促者表未解也喘而汗出者此主之

葛根四兩

黃芩一兩

黃連六兩或作

甘草二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服日進二三服

小柴胡湯三十九太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者

外已解設胃滿痛與服脉但浮者與麻黃湯○傷寒

五六日中風往來寒熱胃腸苦煩默默不欲食心煩
喜嘔或胃煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞輕或
心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者此主之
○血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相薄結於脇
下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食臧
府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此主之○服
柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○傷寒四五日身
熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者此主之○傷
寒陽脉沉陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不

差者此主之○太陽病過經十餘日發汗吐下之後
四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下
急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之即愈○
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者
此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀此主之○傷
寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大
便鞭脉細者爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦在
裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入
在裏此爲半在裏半在表也脉雖沉緊不得爲少陰

病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也
可與服此設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔
而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在
者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却
發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也大
陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之
宜半夏瀉心湯已上屬太陽○陽明病發潮熱大便溼小
便自可胃腸滿不去者與服之○陽明病腸下鞭滿
不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液

得下胃氣因和身戢然汗出而解○陽明中風脉弦
浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻
乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時
噦耳前後墮刺之小差外不解病過十日脉續浮者
與此藥主之已上屬陽明○太陽病不解轉入少陽脇下
鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下欬逆者此
主之若已吐下發汗溫針譴語小柴胡湯證罷此爲
壞證知犯何逆以法治之已上屬少陽○嘔而發熱者宜
服屬厥陰○傷寒差已後更發熱此主之脉浮者以汗

升其方重
 入八分三
 兩泉十二
 散半夏半
 升柴胡半
 斤甘草三
 兩生薑三
 兩水一斗
 二升取六
 升去滓再
 煎取三升
 服一升日
 三

解之脉沉實者以下解之
後屬辨陰陽易差

黃芩 一兩半若腹中痛者去黃芩加芍藥一兩
半芍藥或作三分若心下悸小便不利者

去黃芩加
 茯苓二兩

人參 一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂
枝一兩半溫覆微汗愈若欬嗽者去人參

并棗子加五味子一
 兩一分乾薑一兩

棗子 六枚若腸下痞鞭去棗子加
牡蠣二兩熬牡蠣或作一兩

半夏 一兩一分湯洗若胃中煩不嘔者去半夏
人參加括樓實一枚用四分之一若渴者

去半夏更加人參
 三分括樓根二兩

柴胡 四兩
去蘆
 甘草 一兩
半炙

石劉如麻豆大每服沙正藥七生薑四片桑子三
枚水一盞半煮至八分去滓溫服日三服

活人書卷第十二

活人書卷第十三

大柴胡湯

三十

太陽病過十日發汗吐下之後四

五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止

一云嘔心止小安

下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者此主之

上已

陽太○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此爲實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○
傷寒後脉沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實
也急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脉陰
陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微者下之而解
宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可
下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧
狀日晡所發熱者屬陽明脉實者可下之大柴胡大

承氣湯主之

屬可下
病脉證

化藥方宋
 兩半斤黃
 本方藥三
 兩半夏半
 升枳實四
 枚生薑五
 兩炙子十
 二枚水一
 斗二升取
 六升去滓
 再煎服一
 升日三

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

各一兩半

半夏

一兩一分洗

枳實

二枚去穢炒千金云枳實去穢一分準二枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服以利為度未利

再服

本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯

三十二

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

疼微嘔心下支結外證未去者此主之

屬太

○發汗

多亡陽譫語者不可下與此藥和其榮衛以通津液

後自愈

屬發汗後病脈證

仲景方藥

胡四兩桂

枝黃芩人

參芍藥一

兩半甘萆

一兩半厚

二合半生

薑一兩桑

子六枚水

七升取三

升服一升

日三

仲景方藥
明半斤桂

柴胡一兩
三錢

桂枝去皮

黃芩

人參

芍藥各半

半夏四錢
一

甘草三錢
一

字炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯

三十三

傷寒五六日已發汗而復下

之膏脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來

寒熱心煩者此為未解也宜服之

屬太

柴胡四兩

桂枝去皮

黃芩各一
兩半

枳實三
 枳殼三
 五乾薑二
 兩若接氣
 四兩水一
 斗二升取
 六升去滓
 再煎取三
 升服一升
 日三
 仲景方
 胡四兩
 蒼龍骨
 丹人參桂
 枝各一
 兩半大黃

牡蠣熬

甘草炙

乾薑炙

括樓根二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服食頃再服

柴胡加龍骨牡蠣湯三十三傷寒八九日下之胃滿煩

驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者此主之

柴胡

黃芩

龍骨各一兩

鈎丹

人參

桂枝

茯苓各三

大黃半兩

半夏半合
湯洗

二兩半夏
二合半牡

蠣一兩生

薑一兩半

棗十六枚

水八升取

四升內六

黃連一

沸服一升

據此柴胡

當用二兩

黃芩龍骨

各升人參

桂枝茯苓

當用三分

大黃當用

一兩半夏

當用一合

牡蠣

一分半版

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見

柴胡加芒消湯

補

傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日

晡所發潮熱已而微利此本柴胡下之以不得利今

反利者知盤以圓藥下之此非其治也潮熱者實也

先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消主之

黃芩

人參

各半兩

柴胡

一兩三錢三字

芒消

一兩

甘草

炙半兩

半夏

四錢一字湯洗

一、分半粒
二、分半粒

仲景方於

小柴胡湯

方內加半

有六兩餘

依前法服

不解更服

仲景方桂

枝甘草二

兩石膏如

雞子大者

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓內芒消更微沸溫服

大青龍湯

三十五

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛

不汗出而煩躁者此藥主之若脉微弱汗出惡風者

不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也○傷寒

脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者此主之

屬太

陽

桂枝

去皮一兩

甘草

一兩炙

石膏

如半箇雞子大碎

杏仁

二十枚去皮尖

麻黃

三兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

八四十箇
 生薑六兩
 生薑三兩
 枳子十二
 枳水九升
 麻黃錢
 一升內藥
 取三升服
 一升取微
 飲汗

右劉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子二
 枚水一盞半煮至八分去滓溫服取汗為度若汗
 周身潤止後服未周身潤可停待相次服盡不欲
 汗多恐亡陽故也若汗多不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藥本

川芎

白芷

各等分

右搗羅為細末每末一兩入米粉三兩和之粉撲
 周身止汗無藥本亦得若汗已出後盡劑服汗多

亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

小青龍湯三六傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之○傷寒表不

解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小

便不利小腹滿或喘者此主之

芍藥 桂枝去皮 乾薑炮

甘草炙 細辛各一兩半 五味子一兩別本或加一分

半夏一兩半湯洗若渴者去半夏加括樓根一兩半

麻黃一兩半微利者去麻黃加芫花如一彈子熱令赤色若噎者去麻黃加附子半箇炮

景方考 桂枝乾 無不炮甘 半細辛三 兩五味子 半升半夏 半升麻黃 二兩芫花

如雞子大附子一枚茯苓四兩杏仁半升水一斗煮麻黃減二升內藥取三升服

仲景方考藥六兩桂枝二兩膠饴二兩麻子十升水半斗

若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓二兩若喘者去麻黃加杏仁一兩半去皮尖麻黃湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服杏仁半夏二味或各作一兩一分

小建中湯

三十七

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三

日心中悸而煩者宜服

芍藥

三兩

甘草

炙一兩

桂枝

一兩半去皮

膠饴

半斤舊有微酒或嘔者去膠饴局方加黃耆一兩半為黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

三兩水七
升取三升
內服飽更
生後失而
難服一升
皆三

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再煎化溫服日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑加黃耆末一錢

煎造膠飴法

糯米

一升揀淘淨

大麥蘖末

六兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却入盆子內都以藥末拌和入一磁罐子可容五升許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐

于內約內面飯上湯三指許即得布并紙三五重
蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏即溫和至一
宿見米浮在水面上即以布絞裂取清汁銀石器
內煎至面上有膜即以木篋不住手攪至稀糊以
磁器收夏月置井中庶不酸

大陷胃湯

三十八

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則

爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反
惡寒表未解也盛及下之動數變遲膈內拒痛胃中
空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下

因鞭則爲結腎大陷腎湯主之若不結腎但頭汗出
餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六
七日結腎熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者宜服
○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡
湯但結腎無大熱者此爲小結在腎脇也但頭微汗
出者此主之○太陽病重發汗而復下之不大便五
六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹
鞭滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發
熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復

仲景方大
 黃六兩半
 芒消一升
 芒消一升
 水六升煮
 大黃取二
 升內消者
 一兩沸內
 芒消末服
 一升

與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也此主之

已上屬太陽

大黃

一兩半去皮
錦文者為末

甘遂

一字赤連珠
者細羅為末

芒消

五分

右以水二盞先煮大黃至一盞去滓下消一沸下

甘遂末溫服得快利止後服

又大陷胸湯方

桂枝

一兩

甘遂

一兩或作半兩

大棗

一兩或作三枚

人參一兩

托樓實

一枚去皮只用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服膏中無堅物勿服之

大陷膏圓

三十九

病發於陽而反下之熱入因作結胃

病發於陰而反下之

汗出一有

因作痞也所以成結胃者

以下之太早故也結胃者項亦強如柔痙狀下之則

和宜此藥主之

屬太陽

作東於大黃半斤三

大黃

二兩或作四兩

芒消

三分

杏仁

三分去皮尖熬黑

消半升杏人半升煮

苦苧蘼子

三錢熬

產半升甘
遂一錢七
蜜二合水
二升取一
升

合藥方半
夏半升括
櫨實十名
一枚水六
升去滓內
藥取二升

右搗羅二味內杏人芒消合研如脂圓如彈子大

每服一圓抄甘遂末半錢七白蜜一合水二盞煮

取一盞頓飯一宿乃下如不下再服甘遂性猛宜斟酌量虛實

服之

小陷育湯四十二小結育病正在心按之則痛脉浮滑

者此主之屬太陽

半夏

湯洗秤二兩半

黃連

一兩

括櫨

一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮括櫨至一盞半下諸藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃涎便安

別微熱
惡寒者
宜微惡寒
考

也

大承氣湯

四十二

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濇然汗出者此大便秘也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也

一法與桂枝湯

其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下○陽明病潮熱大便微硬者可與此藥

不鞭者不可與之○傷寒若下後不解不大便

五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱譫語者此主之若一服利則止後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳宜服○陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之瀝然汗出則愈汗出譫語者以爲有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足桮桮

列無傷寒
六二二
條

汗出大便難而讞語者下之則愈宜服○陽明病下
之心下懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭
鞭後必溏不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱
汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實
者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜
桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者
此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒
六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微
熱者此爲實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者

急下之宜服○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七日小便少者雖不大便但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹澹小便利尿定鞭此主之○發汗不解腹滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之宜服○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘目不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下利其脉不負者爲順也負者失也互相剋賊名爲負

也脉滑而數者有宿食也當下之宜服

陽明 已上屬

○水

陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服○少陰病自

利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服○

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服

已上屬

○下利三部脉皆平按之心下硬者急下之宜服○

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服○

寸口脉浮而大按之反濇尺中微而濇故知有宿食

當下之宜服○下利不欲食者以有宿食故也當下

之宜服○下利差至其年月日時復發者以病不盡

似其方大
 重西厚
 杜華斤和
 宜五枚老
 須三合水
 一斗者三
 物重五升
 去滓內大
 黃取一升

故也當下之此主之○下利脉反滑當下所去下乃

愈此主之○脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者

陽中有陰也可下之宜服○病腹中滿痛者此為實

也當下之宜服此主之已上屬可下病脉證

大黃二兩錫文者去皮生用酒洗過
 枳實四枚或作三枚去穢炒淨秤用半兩

厚朴四兩去皮薑汁炙
 芒消二兩或作一合半消有蘆頭者亦得

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮厚朴

枳實至一盞餘下大黃煮取六分去滓入芒消煎

一二沸放溫服以利為度未利再與一服

濕蒸二
辨分再服

小承氣湯

四十二

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承

氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎
欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有
燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必
澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水
則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯
和之不轉失氣者不可攻也○陽明病脉遲雖汗出
不惡寒其氣必重短氣腹滿而喘有潮熱者此爲外
欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大

承氣湯主之。若腹大滿不通者，與小承氣湯微和胃氣，勿令大泄下。○陽明病，其人多汗以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕則譫語。此藥主之。若一服譫語止，更莫復服。○陽明病，譫語潮熱，脉滑而疾者，此藥主之。因與承氣湯一升，腹中轉氣者，更服一升。若不轉氣者，勿更與之。明日又不大便，脉反微濇者，裏虛也，爲難治，不可更與承氣湯。○太陽病，若吐若下，若發汗後，微煩，小便數，大便鞕者，與小承氣湯和之愈。○得病二三日，脉弱無太陽柴胡證，煩躁，心下鞕，至四

藥方
三枚水
四升取一
升二分

五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安

明○傷寒下利譫語者有燥屎也此主之

屬厥陰

大黃

四兩去皮

厚朴

二兩去皮

枳實

四枚或作三枚去穢炒淨秤半兩也

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一大盞半煮至八分去滓溫服以利為度初服湯更衣者止後服不爾者再服之

調胃承氣湯

四十三

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱

者實也當和胃氣此主之○太陽病未解脈陰陽俱

停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗之而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜服○傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掌急與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯○傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反

甘草二兩
芒消二兩
同芒消半

和者此為內實也此主之○太陽病過經十餘日心
下溫溫欲吐而胃中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩
先此時自極吐下者與服之若不爾者不可與但欲
嘔胃中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也
○陽明病不吐不下心煩者可與服○太陽病三日
發汗不解蒸蒸熱者屬胃也此主之○傷寒吐後腹
脹滿者與服已上屬陽明

甘草

一兩

大黃

二兩
去皮

芒消

一兩三分或
作一兩一分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一大盞煎至

加水三升
取一升去
滓內芒消
微煮令沸
少少溫服
之

漿水
七升取二
升半去滓
內消上火
微沸先食
服五合日

七分去滓下硝更上火二三沸溫頓服之

桃核承氣湯

四十四

太陽病不解熱結膀胱其人如狂

血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外

外解已但少腹結者乃可攻之宜用此藥

屬太陽

大黃

四兩

桂枝

去皮二兩

甘草

炙二兩

芒消

二兩

桃人

去皮尖雙仁者五十箇槌碎

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水二大盞煮至

八分去滓下硝煎化溫服以微利爲度未利移時

再服

梔子豉湯

四十五

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必

反覆顛倒心中懊憹此主之○發汗若下之而煩熱
胃中窒者此主之○仲景云凡用梔子湯病人舊微
溲者不可與服之○傷寒五六日大下之後身熱不
去心中結痛者未欲解也此主之

已上屬太陽

陽明病

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反
惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譫語若加溫針必
休惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心
中懊憹舌上胎者此主之○陽明病下之外有熱手

仲景方香
豉四兩梔
子十四枚
水四升取
梔子湯二
升半內香
豉取一升
浮冰一服

足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者此主
之○下利後更煩按之心下濡者為虛煩也此主之
屬厥陰

香豉 二兩

肥梔子 十六枚擘碎
或作十四箇

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮梔子
至一盞入豉煎至七分去滓溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯 四十六 發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者

此主之 屬太陽

小方廣
卷之
二
兩加甘草
二兩餘
煎法

和黃方
二兩加甘草
二兩餘
煎法

梔子 七枚

甘草

豉 各一兩

右分二服以水二盞先煎梔子甘草至一盞內豉同煎取七分去滓溫服得快吐止後服

梔子生薑豉湯 四十七 發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若嘔者此

主之 屬太陽

梔子 七枚

生薑 二兩半

豉 一兩

右分二服以水二盞先煮梔子生薑至一盞內豉同煎至七分去滓溫服得快吐止後服

活人書

十三卷

十一

活人書卷第十三

活人書卷第十四

梔子厚朴湯四人治傷寒下後

者屬太

梔子

大者七枚擘碎

厚朴

去皮姜汁炙二兩

枳實

二枚取去穢麤炒拜一分

右剉如麻豆大分作二服以水二盞半煮至八分

去滓溫服得吐止後服

梔子乾薑湯

四十九

治傷寒醫以圓藥下之身熱不去

微煩者

屬太

梔子

七枚

乾薑

一兩

景方

十四枚

十四兩

四兩

水三升半

取一升半

分二服

仲景方

二十四枚

乾薑二兩
水三升半
取一升半
分二服

仙丹方秘
子十五枚
黃蘗二兩
甘草一兩
水四升取
一升半分
再服

桂枝
四兩

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去

滓溫服得吐止後服凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與之

梔子蘗皮湯五十治傷寒身黃發熱屬太

梔子八枚黃蘗一兩甘草半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮三七

分去滓溫服

茯苓桂枝甘草大棗湯五十二治發汗後其人臍下悸

者欲作奔豚屬太

桂枝二兩甘草一兩茯苓去皮六兩
或作四兩

八二兩
 苓半斤
 干五枚
 半煮
 苓二升
 藥取三
 煎一升
 三
 傳最
 苓四兩
 桂
 白木二
 兩水六
 取三升

右剉如麻豆大每服抄五錢匕漿二箇用甘爛

一盞半煮至八分去滓溫服作甘爛水法用水二

之上有珠子五六千顆有珠相逐取用之

茯苓桂枝白朮甘草湯五十二治傷寒若吐若下後心

下氣上衝胃起則頭眩脉沉緊發汗則動經身

為振振搖者屬太

茯苓 桂枝 甘草

白朮各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

三服

分去滓溫服

茯苓甘草湯五十三傷寒汗出而渴者五苓散主之不

渴者此主之屬太陽

桂枝去皮

茯苓各二兩

甘草一兩炙

藥方生薑三兩水四升取二升分三服

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五片煮至八分去滓溫服

甘草湯五十四少陰病二三日咽痛者可與服不差者

與桔梗湯

甘草二兩

仲景方水一升取一

二

佛藥水
三升取一
升五合分
再服

右劉如麻豆大每服抄四錢七水一盞煮至六分
去滓溫服日二服

甘草乾薑湯五十五傷寒脉浮自汗出小便數心煩微

惡寒脚攣急久與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥

咽中乾煩躁吐逆者宜此藥屬太

甘草四兩乾薑二兩

右劉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

炙甘草湯五十六治傷寒脉結代心動悸屬太

仙靈方廿
 草四兩八
 參二兩生
 地黃一斤
 桂枝三兩
 麻人半升
 麥門冬半
 升薑三兩
 棗十二枚
 阿膠二兩
 水八升酒
 七升取三
 升去滓內
 煎服一

甘草

二兩

人參

一兩

生地黃

八兩

桂枝

一兩半
去皮

麻人

一兩

麥門冬

一兩二
分去心

右剉如麻豆大每服抄五錢七入薑五片棗一枚

水一盞半入酒半盞煮至八分去滓內阿膠一片

膠烱盡溫服日三服

芍藥甘草湯

五十七

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微

惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥

咽乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若

厥愈足溫者更與此藥

屬太

甘草 白芍藥 各二兩

厚朴 生薑 半夏 人參 湯 各一兩 分

甘草

白芍藥 各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

厚朴生薑半夏人參湯

五十八 治發汗後腹脹滿者 湯

厚朴 四兩 去皮

半夏 一兩 一分

甘草 一兩

人參 半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五

片煮至八分去滓溫服

大黃黃連瀉心湯

五十九

治心下痞按之濡其脉關上

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解
也不可攻痞當先解表表解乃可以攻痞解表宜桂枝
湯攻痞宜服此藥

屬太陽

大黃 二兩

黃連 一兩

黃芩 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以百沸湯二大盞
熱漬之一時久絞去滓煖動分二服

附子瀉心湯

六分

治心下痞而復惡寒汗出者

屬太陽

大黃 二兩

黃連

黃芩

各一分

附子

一枚炮去皮破川取汁

補藥無遺
分再服

仲景方湯
二升分再
服

仲景方湯
連一兩黃
芩乾薑不
病人參其

右三味剉如麻豆大每服抄五錢匕以百沸湯二
大盞熱漬之一時火絞去滓內附子汁分溫再服
半夏瀉心湯天十二傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯
證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此
雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若
心下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胃湯主之但滿
而不痛者此為痞柴胡不中與之宜服此陽太

黃連半兩

黃芩

乾薑炮

人參

甘草

半夏

炙各一兩一分
湯洗七遍

草二兩半
夏半升
十二枚水
一斗取六
升去滓再
煎取三升
服一升日
三

仲景方其
草四兩乾
薑不炮黃
芩三兩黃
連一兩寒
三枚半安

右剉如麻豆大每服抄五錢匕大棗二枚水一盞
半煮至八分去滓溫服

甘草瀉心湯六十三傷寒中風醫反下之其人下利日

數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩
不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此
非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜服此

甘草二兩乾薑炮黃芩各一兩半

人參各半黃連各半大棗六枚

半夏一兩一分洗

玉洋再煎

治傷寒脉浮滑者表裏有熱○又三陽

要三升服
要升三

知母方知
母六兩廿
事二兩石
膏一斤柳
木六合水
一斗米熟
湯皮服一
升日三

合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿
發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者○傷寒脉滑而厥者裏有熱並主之

知母 三兩

甘草 一兩

石膏 八兩碎

粳米 三合

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八
分取米熟為度去滓溫服

白虎加人參湯天十五服桂枝湯大汗出大煩渴不解

脉洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解

漢方於
自虎湯方
內加人參
三兩餘依
自虎湯法

裏表裏俱熱時時惡寒大渴舌上乾燥而煩欲飲水
數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者並

主之

屬太陽

人參

二兩

知母

一兩半

甘草

炙二兩或作半兩

糯米

一合半

石膏

四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮去八

分取米熟為度去滓溫服

五苓散

六十六

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不

得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉

浮小便不利微熱消渴者○發汗已脉浮數煩渴者

○傷寒汗出而渴者

不渴者與茯苓甘草湯

○中風發熱六七

日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水

逆者○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人

渴而口燥煩小便不利者

屬太陽

○太陽病寸緩關浮

尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以

醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬

陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也

欲飲水少少與之但以法救之或渴者

屬陽明

○霍亂

仲景方澤

陶一兩六

豚猪苓茯

白木十

八錢在枝

二兩服方

可七日三

多飲暖水

汗出愈

仲景方阿

膠不炙

頭痛發熱身疼熱多飲水者

並主之

澤瀉

一兩一分

猪苓

去黑皮秤

茯苓

去皮秤

白木

各三分

桂枝

去皮半兩不見火

右搗篩為散拌和每服抄三錢匕白湯調下此藥

須各自事持秤見分兩然後合

猪苓湯

六十七

陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利

者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

並主之

猪苓

去皮

茯苓

阿膠

炙過

四升煮取

二升去滓

下膠烱消

服七合日

三

仲景方扶

苓芍藥三

兩八參二

兩白朮四

兩附子二

枚不炮水

澤瀉

滑石各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

分去滓溫服

附子湯

六十八

少陰病得之一二日口中和背惡寒者

當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者並

宜服之

茯苓

芍藥各一兩半

人參一兩

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

八升煮取
三升服一
升日三服

分去滓溫服日三服

木附湯

六十九

傷寒八九日風濕相薄身體疼痛不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

若其人大便堅小便自利者此主之

屬太陽

白朮二兩

甘草一兩

附子

一枚半
炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑五片大棗一

枚水一盞半煮至七分去滓溫服日三服一服覺

身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪也

卽是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之

但景方生
鹽二兩半
棗六枚水
三升煮取
一升分三
服日三
服別本作
去滓湯者
只一服

佛手散
無骨字

佛手散
甘草白木二
兩附子二
枚桂枝四
兩水六升
煮取三升
服一升日
三服初服

耳法當加桂一兩其大便堅小便自利故不加桂也

甘草附子湯

七十

治風濕相薄骨節疼痛掣骨痛不

得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲

去衣或身微腫者

屬太陽

甘草

炙

白朮

各一兩

附子

一枚炮去皮

桂枝

二兩或作三兩身腫者加防風二兩
悸氣小便不利者加茯苓一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

分去滓溫服汗出即解

得微汗則
解能食
出後煩者
服五合恐
一升多者
服六七合
為妙
仲景方水
五升者取
一升五合
分服

芍藥甘草附子湯 七十二
發汗病不解反惡寒者虛故
也此主之

芍藥 三兩
甘草 三兩
附子 一枚炮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七

分去滓溫服

乾薑附子湯 七十三
下之後復發汗盡日煩躁不得眠

夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者此

主之 陽 滿太

乾薑 一兩 炮
附子 一枚生 用去皮

傳方水
三升者取
一升頓服

由景方各
炮川薑不

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七
分去滓溫服未知再服

理中圓 七十三 霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者此主之○大病差後喜

唾久不了了胃中有寒當以圓藥溫之宜服此 屬陰陽差

後勞復
病脉證

乾薑 炮

甘草 炙

人參 腹痛者倍之

白朮 各雨

右搗篩煉蜜和圓如鷄子黃許大以湯數合和一

此是方乾
製不炮水
八升煮取
三升服一
升日一

圓研碎溫服之日三夜三服腹中未熱益至三四
圓熱粥飲之微自溫履勿揭衣然不及湯又方

人參

乾薑

甘草

炙

白朮

各三兩

腹痛者加人參一兩半寒者加乾薑一兩半渴欲
得水者加白朮一兩半脾上築者腎氣動也去朮
加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用
朮悸者加茯苓二兩或四肢拘急腹滿下利或轉
筋者去白朮加附子一枚生用

有劉如麻夏大每服粉五錢七水一盞半煮至八
分去滓溫服日三服

四逆湯 治上 傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒
脚攣急與桂枝湯付之復厥咽乾煩躁吐逆作甘草
乾薑湯與之厥愈更作甘草湯與之其脚伸若
胃氣不和與調胃承氣湯若重發汗加燒針者傷寒
醫下之續後下利清穀不止身疼痛急當救裏後身
疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜
桂枝湯 病太陽 ○自利不渴者以其藏有寒故也當

溫之宜服

屬太陰

或脈浮而遲表熱裏寒下利清穀

者此並主之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲

吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實不

可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當

溫之或脈沉者急溫之並宜服

屬少陰

○大汗若大下

利而脈冷者或大汗出熱不去內拘急四肢疼又下

利厥逆而惡寒者或下利腹滿身疼痛者先溫裏乃

攻表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯或嘔而脈弱小

便復利身有微熱見厥難治此並主之

並屬厥陰

○吐利

伊秉方疏
三升煮取
一升二合
分再服

汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者吐利小便復
利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者此主
之屬霍亂

甘草

二兩炙

附子

一箇生用

乾薑

一兩半炮

右剉如麻豆大每服抄四錢匕水一盞半煮至七
分去滓溫服○強人加附子半箇乾薑加一兩半

四逆散

七十五

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不

利或腹中痛或泄利下重者此主之

屬少陰

甘草

炙

柴胡

枳實

去白穢炒黃

方服
 寸七服
 利下重者
 小五升者
 三升取
 二升去滓
 以散三方
 寸七內湯
 中取一升
 半分減

和藥方於
 針建湯內

芍藥

已上各一兩

右搗節爲細散米飲調下二錢日三服欬者加五味子乾薑各半兩并主下利悸者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮裂泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服

四逆加入參湯

七十六

惡寒脉微而利利止者亡血也

此主之

屬霍亂

甘草

二兩炙

人參

一兩

附子

一枚生去皮

藥人參一
兩錢後四
錢湯法服

懷柔方快
苓六兩八
米一兩廿
草二兩九
附子一兩
水五升煮
取三升服

乾薑 一兩
半炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服日三服

茯苓四逆湯 治發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓 三兩 人參 半兩 甘草 一兩

乾薑 七錢 附子 半箇生

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

當歸四逆湯 治手足厥寒脉細欲絕者

厚朴方寸
 藥桂枝方
 藥細辛三
 兩連草三
 草二兩半
 二十五箇
 水八升煮
 取三升服
 二升日三
 服
 仲景方
 藥桂枝方
 藥細辛三
 兩連草三
 草二兩半
 更二升水

當歸洗

桂枝

芍藥

細辛

各一兩半

通草

甘草

各一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮于一枚煮至八分去滓溫服

當歸四逆加茱萸生薑湯

七十九

有當歸四逆湯證若

其人內有久寒者宜服

厚厥

當歸

洗

桂枝

去皮

芍藥

細辛

各一兩半

甘草

炙

木通

各一兩

茱萸

五兩

一十五枚
水六升酒
六升煮取
五升分五
服

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片大棗二
枚水一盞半煮至八分去滓溫服

活人書卷第十四